



Kazuistiky

Ilja Tachecí

2. Interní gastroenterologická klinika FN a LF UK v Hradci Králové



1.



1 (67-letý muž)

Indikace

- krvácení z neurčeného zdroje

VIDEO 18



1 (67-letý muž)

Indikace

- krvácení z neurčeného zdroje

VIDEO 19



1 (67-letý muž)

Indikace


- krvácení z neurčeného zdroje

02:22:18



PillCam® SB 3

01:47:11



PillCam® SB 3

PillCam® SB 3



?



1 (67-letý muž)

divertikly tenkého střeva

enteroklýza





2.



2 (72-letý muž)

Indikace

- celiakie s malnutricí
- nemocný s zavedenou nasojejunální sondou

VIDEO 20




2 (72-letý muž)

Indikace


- celiakie s malnutricí
- nemocný s zavedenou nasojejunální sondou

00:00:40



PillCam® SB 3

01:01:59



PillCam® SB 3



?



2 (72-letý muž)

- perzistence kapsle nad dolním jícnovým svěračem v okolí sondy
- nutnost zavedení endoskopem do žaludku, zachycení do sítěky a zavedení do duodena



[VIDEO 21](#)



3.



3 (66-letý muž)

Indikace

- anemie
- pozitivita stolice na okultní krvácení
- negativní koloskopie

VIDEO 22




3 (66-letý muž)


Dvojbalonová enteroskopie

- ulcerace jejuny
- biopsie benigní
- NSAID v anamnéze – enteropatie z nesteroidních antiflogistik

00:52:20



PillCam® SB 3





4.



4 (52-letý muž)

Indikace

- meleny, negativní gastroscopie, koloskopie
- nutnost opakovaných krevních převodů

[VIDEO 23](#)

[VIDEO 24](#)




?



4 (52-letý muž)

Doplněna dvojbalonová enteroskopie






?



4 (52-letý muž)



Doplněna dvojbalonová enteroskopie – **Dieulafoyova léze**





4 (52-letý muž)

Doplněna dvojbalonová enteroskopie – **Dieulafoyova léze, ošetřena hemoklipem**





5.



5 (32-letý muž)

Indikace

- meleny, negativní gastroskopie,
koloskopie



VIDEO 25



5 (32-letý muž)

Indikace

- meleny, negativní gastroskopie, koloskopie






?



5 (32-letý muž)


Meckelův divertikl – enteroklýzu, chirurgické řešení





5 (32-letý muž)

Meckelův divertikl – enteroklýzu, chirurgické řešení, resekce divertiklu





6.



6 (32-letý muž)

Indikace

- anemie



VIDEO 26



6 (32-letý muž)

Indikace

- anemie





6 (32-letý muž)

MRI - GIST

